



PERÚ

Ministerio
de Salud

Anteproyecto de Directiva Sanitaria para la vigilancia, prevención y control de la enfermedad de Carrión


Actualización del documento validado en Taller Nacional en mayo del 2012
Presentado por Juan Manuel Nunura Reyes
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
Lima. Hotel Costa del Sol. 20 de setiembre 2017

Contenido

- **I. Escenarios de las enfermedades infecciosas**
- **II. Anteproyecto de Directiva Sanitaria**

- **I. Escenarios de las enfermedades infecciosas**

Control parcial



EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS PERU 2017

DENGUE

MALARIA

LEPTOSPIROSIS

ENFERMEDAD DE CARRION

HEPATITIS B

CHIKUNGUNYA

LEISHMANIASIS

TBC MDR

ENFERMEDAD DE CHAGAS

VIH

OROPUCHE

ZIKA

MAYARO


RABIA CANINA

FIEBRE AMARILLA


SARAMPION
EBOLA

RUBEOLA
VIRUELA (erradicada)

Dinámica del dengue



Dinámica de la enfermedad de Carrión



Escenarios epidemiológicos de la enfermedad de Carrion

ESCENARIO	VECTOR	CASOS AUTOCTONOS DE ENFERMEDAD DE CARRION
Área sin riesgo	(-)	(-)
Área con riesgo	(+)	(-)
Área con transmisión	(+)	(+)




PERÚ

Ministerio de Salud



Tendencia histórica de la malaria en el Perú 1939 – 2017



* Hasta la SE 35 - 2017

- **II. Anteproyecto de Directiva Sanitaria**

Definiciones operativas

- **Exposición a enfermedad de Carrión:**
Persona que estuvo dentro de los últimos 100 días contados a partir de la fecha de inicio de síntomas en área con transmisión de *Bartonella bacilliformis* (Bb).
- **Nexo epidemiológico en enfermedad de Carrión:**
Es la relación en tiempo que existe entre un caso probable con un caso confirmado de enfermedad de Carrión en un área de brote.

Definiciones operativas

- **Caso sospechoso de enfermedad de Carrión aguda**
Persona con fiebre o sensación de alza térmica en los últimos 14 días y exposición a enfermedad de Carrión.
- **Caso probable de enfermedad de Carrión aguda**
Caso sospechoso y uno o más de lo siguiente:
 - palidez
 - ELISA IgM reactivo
 - ELISA IgG reactivo
- **Caso probable de enfermedad de Carrión crónico o eruptivo**
Persona con verruga(s) de color rojo o violeta en piel o nódulos subcutáneos con tiempo de evolución no mayor a 6 meses.

Definiciones operativas

- **Caso confirmado de enfermedad de Carrión**

- a) **Por laboratorio**

- Persona, caso sospechoso o caso probable de EC aguda o caso probable de EC crónico o eruptiva y resultado positivo a una de las siguientes pruebas:

- Western blot
 - Frotis de sangre periférica
 - Aislamiento de *Bartonella bacilliformis* de cultivo sanguíneo o de lesión verrucosa
 - PCR de sangre o tejido
 - Estudio histopatológico

- b) **Por nexa epidemiológico ^a**

- ^a No aplica para los casos probables de EC fallecidos.

Definiciones operativas

- **Caso descartado de enfermedad de Carrión**
 - a) Por laboratorio**

Persona, caso sospechoso o probable de EC aguda o caso probable de EC crónico o eruptiva que no es confirmado por laboratorio.
 - b) Por evidencia de otra enfermedad**

En brote, se descarta la persona o caso que; cuando no habiendo sido confirmado para EC; tiene un diagnóstico confirmado de otra enfermedad.