



PERÚ


Ministerio
de Salud

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA FIEBRE AMARILLA

PÚBLICO EN GENERAL

**Lo que usted debe saber
para prevenir la**




FIEBRE AMARILLA

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA FIEBRE AMARILLA


PÚBLICO EN GENERAL

¿Qué es la fiebre amarilla?

- * La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, hemorrágica.
- * Su nombre deriva por la tonalidad amarilla que adquiere la piel del enfermo (piel amarilla).




¿Cómo se transmite la fiebre amarilla?



- * El contagio solo se produce por la picadura de zancudos infectados con el virus de la fiebre amarilla.
- * Si bien cualquier persona puede contraer la fiebre amarilla, las personas de mayor edad, los niños y las gestantes, tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad grave.
- * La enfermedad no se contagia de persona a persona.

¿Qué zancudos pueden transmitir la fiebre amarilla?

- * La fiebre amarilla selvática es transmitida por los zancudos *Haemagogus* y *Sabethes*.
- * Las diferentes especies de zancudos viven en distintos hábitats. Algunos se crían cerca de las viviendas (domésticos), otros en el bosque (salvajes), y algunos en ambos hábitats (semidomésticos).




Zancudos – vectores que transmiten la fiebre amarilla

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA FIEBRE AMARILLA

PÚBLICO EN GENERAL

Hay tres tipos de ciclos de transmisión:



a) Fiebre amarilla selvática: En las selvas tropicales, los monos, que son el principal reservorio del virus, son picados por zancudos que transmiten el virus a otros monos. Estos zancudos infectados pueden picar a otros monos o a personas que entran en la selva.

b) Fiebre amarilla intermedia: En las zonas semi-urbanas, cercanas a zonas selváticas, los zancudos semidomésticos, infectan tanto a los monos como a las personas.

c) Fiebre amarilla urbana: Las personas infectadas introducen el virus en zonas muy pobladas, con gran densidad de zancudos y donde la mayoría de la población tiene escasa o nula inmunidad por falta de vacunación. En estas condiciones, los zancudos infectados transmiten el virus de una persona a otra.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla?

Los síntomas más comunes son:

- * Fiebre
- * Ictericia (piel amarilla)
- * Dolores musculares y de cabeza
- * Náuseas
- * Vómitos y
- * Cansancio

Una pequeña proporción de pacientes infectados presentan complicaciones, y aproximadamente la mitad de estos casos fallecen en un plazo de 7 a 10 días.



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA FIEBRE AMARILLA

PÚBLICO EN GENERAL

¿Cuál es el tratamiento de la fiebre amarilla?



* No hay tratamiento específico para la enfermedad, se trata la fiebre, la deshidratación, la insuficiencia hepática y renal.

* La hospitalización de los casos de fiebre amarilla y el tratamiento oportuno incrementan la supervivencia.

¿Cómo se puede prevenir la fiebre amarilla?


* La vacuna es la medida preventiva más importante y la prevención de las picaduras de zancudos.

* La vacuna debe administrarse 10 días antes de ingresar a zonas donde se pueda contraer fiebre amarilla.

* Una sola dosis es suficiente para brindar inmunidad y protección para toda la vida.



¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la fiebre amarilla?



* Los niños desde los 9 meses hasta los 59 años que se trasladen a zonas donde puedan contraer fiebre amarilla.

* Los niños a los 15 meses de edad, según el calendario de vacunas.

* La población que vive en zonas donde pueden contraer la enfermedad.

* Personas que viajan hacia zonas con transmisión de fiebre amarilla.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA FIEBRE AMARILLA

PÚBLICO EN GENERAL


¿Quiénes y por qué no deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

* La población que no debe ser vacunada son los niños de 9 meses, las gestantes, los adultos de 60 años a más, y aquellas personas que presenten alergia al huevo.

* Excepcionalmente podrán ser vacunados en contexto de epidemia, previa evaluación médica y en un establecimiento de salud con mayor capacidad resolutive.



¿Qué medias preventivas deben tener en cuenta los viajeros que visitarán zonas con transmisión?



* Si viaja a zonas de riesgo, con transmisión de fiebre amarilla, es importante aplicarse la vacuna con 10 días de anticipación del viaje.

* Si excepcionalmente, por alguna razón, no accedieron a la vacunación con la anticipación requerida, debe ser vacunado en el lugar y deben evitar visitar las zonas rurales o campestres, en especial donde existen evidencias de transmisión del virus de la fiebre amarilla.

* Es importante protegerse de la picadura de los zancudos usando ropa ligera que cubra la mayor parte del cuerpo y aplicándose repelente en zonas expuestas.

* Tratar de no permanecer en espacios abiertos durante las horas donde hay más zancudos: desde el atardecer hasta entrada la noche.

¿Cómo podemos controlar la población de zancudos?

El riesgo de transmisión de la fiebre amarilla puede reducirse eliminando los posibles criaderos de zancudos y aplicando larvicidas a los depósitos de agua y a otros lugares donde haya aguas estancadas.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA FIEBRE AMARILLA

PÚBLICO EN GENERAL

¿En qué regiones del Perú hay mayor riesgo de contraer la fiebre amarilla?

Las regiones que tienen zonas de riesgo son:

- * Loreto
- * Madre de Dios
- * San Martín
- * Ucayali
- * Amazonas



- * Junín
- * Ayacucho
- * Cajamarca
- * Cusco
- * Pasco
- * Puno
- * Huánuco

¿Dónde puedes vacunarte?

Si viajas a las regiones antes mencionadas, recuerda que la vacunación es obligatoria y debe realizarse 10 días antes de tu viaje.

Los centros de vacunación gratuitos contra la fiebre amarilla en Lima Metropolitana son:

CENTROS DE VACUNACIÓN	DIRECCIÓN	HORARIO
Hospital Arzobispo Loayza	Av. Alfonso Ugarte N° 848 - Cercado	Martes y jueves de 8:00 am a 12:30 m
Hospital Cayetano Heredia	Av. Honorio Delgado N° 262 Urb. Ingeniería - San Martín de Porres	De lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:30 pm a 4:00 pm. Sábados de 8:00 am a 12:00 m
Hospital Santa Rosa	Av. Bolívar Cdra. 8 S/N - Pueblo Libre	Viernes de 8:00 am a 12:00 m
Hospital Dos de Mayo	Parque "Historia de la Medicina Peruana" S/N Alt. Cdra. 13 Av. Grau - Cercado	Martes y viernes de 8:00 am a 11:00am
Hospital Hipólito Unanue	Av. César Vallejo 1390 - El Agustino	De lunes a sábado de 7.30 am a 12.30 am
Hospital María Auxiliadora	Av. Miguel Iglesias N° 968 - San Juan de Miraflores	Miércoles de 8:00 am a 12:30 m
Terminal Terrestre Yerbateros	Av. Nicolás Ayllon N° 1352 - San Luis	De lunes a miércoles de 5:40 pm a 9:40 pm
Gran Terminal Terrestre Plaza Norte	Av. Tomás Valle - Av. Túpac Amaru	De jueves a domingo de 4:00 pm a 8:00 pm

Fuente:

Organización Mundial de la Salud

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/>

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades

<http://www.cdc.gov/yellowfever/ga/index.html>



PERÚ

Ministerio
de Salud

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA FIEBRE AMARILLA

PÚBLICO EN GENERAL

Visite nuestra página web:

www.dge.gob.pe

Escribanos a:

webmaster@dge.gob.pe

Teléfono:

4613950 (Fax: Anexo 101)

Dirección:

Calle Daniel Olaechea Nº 199 - Jesús María