PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Epidemiología

Información sobre peste

Lo que usted debe saber para prevenir la peste

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Epidemiología

INFORMACIÓN SOBRE LA PESTE

¿Qué es la peste?

* La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Yersinia pestis* que afecta a los roedores pero también puede ser transmitida a los seres humanos.

* Los antibióticos curan la peste pero si una persona infectada no recibe tratamiento con prontitud, es probable que la enfermedad le cause la muerte.



La peste es una enfermedad de los roedores pero puede ser transmitida a los seres humanos

¿Cómo se transmite la peste?

Una persona sana se contagia generalmente por picadura de pulgas infectadas

* Al ser picado por las pulgas de un roedor infectado.

* Al tocar el fluido secretado de la glándula inflamada (bubón) de una persona enferma.

* Al tener contacto directo con un roedor infectado, las bacterias de la peste penetran en el organismo a través de las heridas de la piel.

* Al inhalar las gotitas expulsadas por una persona o animal infectado por la peste puede contagiar la peste neumónica.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la peste?

Los síntomas más frecuentes son:

- Fiebre

- Dolor de cabeza

- Escalofríos
- Malestar general

- Cuando se trata de peste bubónica, se presenta además inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos llamados bubones.

- Si es peste septicémica, también se puede presentar: dolor abdominal, nauseas, vómitos y diarrea.

- Cuando se trata de peste neumónica también se presenta: tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho al respirar y expectoración con sangre.

¿Qué es la peste bubónica?

* La peste bubónica es la forma clínica más frecuente, que presenta generalmente inflamación en la ingle, en las axilas o en el cuello (bubones).
*Ocurre cuando la pulga infectada pica a una persona (no se contagia de una persona a otra).
* Los síntomas de la peste bubónica aparecen repentinamente, por lo general de 2 a 6 días después de la picadura de las pulgas infectadas.



Los "bubones" son nódulos linfáticos inflamados y dolorosos.

¿Qué es la peste septicémica?



La peste bubónica si no se trata, puede transformarse en peste septicémica o neumónica y causar la muerte.

* Ocurre cuando la bacteria de la peste se multiplica en la sangre por sí sola o a consecuencia de una complicación de la peste bubónica. La peste septicémica no se propaga de una persona a otra.
* Cuando ocurre por sí sola, se da de la misma manera que la peste bubónica (al ser picado por la pulga).

¿Qué es la peste neumónica?

* La peste neumónica ocurre cuando la bacteria *Yersinia pestis* infecta los pulmones. Este tipo de peste puede contagiarse de persona a persona a través de las gotitas de saliva de una persona enferma con peste neumónica.



Una persona sana se contagia al respirar las gotitas de saliva de una persona o animal enfermo

* La peste neumónica también puede darse si una persona que sufre de peste bubónica o peste septicémica no recibe el tratamiento rápidamente y la bacteria entra a los pulmones.

* Los síntomas de la peste neumónica aparecen de manera repentina, normalmente de 2 a 3 días después de la exposición.

¿Qué hacer si una persona presenta los síntomas de la peste?



Acuda al establecimiento de salud si presenta los síntomas de la peste

* Si presenta los síntomas de peste y vive o ha visitado lugares donde se presenta la peste, consulte de inmediato en cualquier establecimiento de salud.

* Las personas con peste necesitan tratamiento inmediato. Para tratar la peste, se utilizan antibióticos, y otros medicamentos de acuerdo a su enfermedad que sólo el personal de salud puede recetar.

* Los pacientes con peste neumónica deben ser aislados rigurosamente, y las personas que hayan tenido contacto con una persona enferma de peste o compartan la misma vivienda deben tomar antibióticos como medida preventiva.

¿Cuáles son las medidas de prevención?

Guarde bien los alimentos para evitar que los roedores ingresen a su casa

* Es importante disminuir las fuentes de alimentos para los roedores dentro de las viviendas, con un buen almacenaje de granos (cosecha).
* Los animales domésticos, como cuyes o conejos, deben ser criados fuera de las viviendas y no en el interior de ella.

* No manipule roedores, cuyes o conejos enfermos o muertos, y comunique al establecimiento de salud lo ocurrido.
* Dormir en el suelo incrementa la posibilidad de proliferación de pulgas así como la posibilidad de ser picados por pulgas infectadas.

No manipule roedores enfermos o muertos.

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Epidemiología

Ministerio de Salud

Dirección General de Epidemiología

Visite nuestra página web: www.dge.gob.pe

Teléfono: 631 4500

Fax: Anexo 101 / 140

Dirección: Calle Daniel Olaechea Nº 199 - Jesús María

Diciembre del 2013