

# FIEBRE AMARILLA

La **fiebre amarilla** es una enfermedad viral aguda, hemorrágica. Su nombre deriva por la tonalidad amarilla que adquiere la piel del enfermo.

- Se produce por la **picadura de zancudos infectados** con el virus de la fiebre amarilla.
- La enfermedad **no se contagia** de persona a persona.



## SÍNTOMAS

**Dolores musculares**



**Ictericia (piel amarilla)**



**Dolor de cabeza**



**Náuseas**



**Vómitos**



**Cansancio**




**Fiebre**



## ¿CÓMO PREVENIR?

- Vacunarse 10 días antes de ingresar a estas zonas.
- Una sola dosis de por vida.
- La vacunación en el Perú, está recomendada a partir de los 15 meses hasta los 59 años de edad según calendario de vacunas



Las **zonas de riesgo** en el país incluyen áreas boscosas de la selva alta o baja, en las siguientes regiones:

Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali y Cusco\*.

\*EXCLUYE CIUDAD DE CUSCO, MACHU PICCHU Y CAMINO INCA.

## ¿DÓNDE ME PUEDO VACUNAR?

El Ministerio de Salud del Perú ofrece la vacuna en centros de vacunación públicos:

<https://www.gob.pe/25427-conocer-centros-de-vacunacion-contr-la-fiebre-amarilla-en-el-peru>.

**Ingresa aquí**