




PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de
Enfermedades

Casos notificados de intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) según semanas epidemiológicas (SE) Perú 2021* – 2026 (SE 05)**



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud. Perú (*) Hasta la SE 53 - 2020-2025 y (**) SE 05 - 2026

En la SE 05-2026 se han notificado a nivel nacional 51 casos de intoxicación aguda por plaguicidas, siendo el acumulado de 207. Comparado con los años 2023 y 2024 es menor la notificación de casos de IAP en la SE 05.


Intoxicación aguda por plaguicidas (IAP): distribución y proporción de casos notificados por departamentos. Perú 2025* - 2026**

Departamentos	2025*			2026**		
	Casos	%	TIA por 100 000 habitantes	Casos	%	TIA por 100 000 habitantes
Lima	61	25.5	2.2	73	35.3	1.6
Lambayeque	0	0.0	0.0	26	12.6	98.9
Junin	27	11.3	16.4	16	7.7	6.9
Huánuco	23	9.6	4.5	14	6.8	6.5
La Libertad	7	2.9	1.9	14	6.8	8.9
Ayacucho	15	6.3	11.7	11	5.3	7.4
Cusco	12	5.0	4.0	9	4.3	3.0
Piura	31	13.0	20.6	7	3.4	1.2
San Martin	10	4.2	35.0	6	2.9	4.2
Amazonas	4	1.7	1.2	5	2.4	5.0
Arequipa	18	7.5	58.7	5	2.4	1.2
Cajamarca	9	3.8	15.2	5	2.4	3.4
Apurímac	1	0.4	1.0	4	1.9	3.1
Pasco	2	0.8	2.6	4	1.9	9.2
Ancash	0	0.0	0.0	2	1.0	2.8
Huancavelica	6	2.5	7.7	2	1.0	9.0
Callao	0	0.0	0.0	1	0.5	0.2
Ica	3	1.3	2.1	1	0.5	3.2
Loreto	0	0.0	0.0	1	0.5	1.0
Tacna	4	1.7	2.8	1	0.5	29.8
Puno	5	2.1	2.2	0	0.0	0.0
Ancash	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Ucayali	1	0.4	0.0	0	0.0	0.0
Moquegua	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Madre De Dios	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Tumbes	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Total	239	100.0	4.1	207	100.0	2.6

En la SE 05-2026, el 82,1 % de la notificación de intoxicación aguda por plaguicidas se concentran en los departamentos de Lima Lambayeque, Huánuco, Junín, Huánuco La Libertad, Ayacucho, Cusco y Piura.

Decremento del 13,4 % comparado en el mismo periodo del año 2025.

Incidencia acumulada de intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) por departamentos, Perú – 2026 (SE 05) *



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud. Perú (*) Hasta SE 05 - 2026




PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de
Enfermedades

Intoxicación aguda por plaguicidas (IAP), incidencia acumulada según distritos por departamentos, Perú 2026 (SE 05) *




A nivel nacional hasta la SE 05 del 2026, se han identificado 109 distritos con notificación de intoxicación aguda por plaguicidas, que corresponden a 56 provincias en 18 departamentos.

Distribución proporcional y tasa de incidencia acumulada de Intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) según edad y sexo, Perú 2026 (SE 05*)

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	8	3.9	0.6
Adolescente (12 a 17 años)	30	14.5	4.0
Joven (18 a 29 años)	60	29.0	3.9
Adulto (30 a 59 años)	94	45.4	2.9
Adulto mayor (> de 60 años)	15	7.2	1.4
Total	207	100.0	2.6


Sexo			
Femenino	70	33.8	1.7
Masculino	137	66.2	3.5



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)- Ministerio de Salud. Perú (*) Hasta SE: 05 -2026

El 74,4 % de las IAP se concentran en el grupo de 30 a 59 años (45,4 %) y 18 a 29 años (29,0 %). La mayor tasa de incidencia acumulada se encuentran en adolescentes y jóvenes. El sexo masculino presenta mayor proporción de casos (66,2 %).


Factor de exposición: Intoxicación aguda por plaguicidas según la circunstancia de exposición al plaguicida. Perú 2026 (SE 05) *



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)-Ministerio de Salud. Perú(*) Hasta SE 05 - 2026

Del total de casos investigados de intoxicación aguda por plaguicidas, se observa predominio de la exposición de tipo ocupacional y accidental.


Factor de exposición: Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas según vía de exposición, Perú 2026 (SE 05)*



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)-Ministerio de Salud. Perú(*) Hasta SE 05 - 2026

Del total de casos investigados de intoxicación aguda por plaguicidas, la exposición predominante es la vía oral y dérmica.


Factor de exposición: Intoxicación aguda por plaguicidas según ocupación. Perú 2026 (SE 05)*



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)-Ministerio de Salud. Perú (*) Hasta SE 05 - 2026

Del total de casos investigados, se observa mayor proporción de intoxicación aguda por plaguicidas en las personas con actividad agrícola y estudiantes.


Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas según tipo de intoxicación. Perú 2026 (SE 05)*



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud.Perú (*) Hasta SE: 05 -2026

Del total de casos investigados de intoxicación aguda por plaguicidas, se observa mayor proporción la intoxicación de tipo leve.

Factor de exposición: Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas según nivel de instrucción, Perú 2026 (SE 05) *



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)-Ministerio de Salud. Perú(*) Hasta SE 05 - 2026

Del total de casos investigados de intoxicación aguda por plaguicidas, se observa predominio del nivel de instrucción primaria y secundaria, seguido del nivel primario.




PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de
Enfermedades


Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas según tipo de seguro, Perú 2026 (SE 05) *



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud. Perú (*) Hasta SE: 05 -2026

Del total de casos investigados de intoxicación aguda por plaguicidas, se observa mayor proporción de asegurados del SIS

Factor de exposición: Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas según lugar de ocurrencia, Perú 2026 (SE 05) *



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)-Ministerio de Salud. Perú(*) Hasta SE 05 - 2026