MINISTERIO DE SALUD - PERU

Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades

Sala de situación de salud

Vigilancia Epidemiológica del riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas

Perú a la SE 39 – 2026

(Hasta el 03/10/2026)

La sala de situación de salud es un producto del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto.

Fuente : Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. (*) Hasta la SE – 39 - 2026

Casos notificados de intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) según semanas epidemiológicas (SE) Perú 2021* – 2026 (SE 39)**



(*) Hasta la SE 53 - 2020-2025 y (**) SE 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud - Perú.

A nivel nacional, en la SE 39-2026 han notificado 36 casos de intoxicación aguda por plaguicidas, siendo el acumulado de 1515 casos. Comparado con los años 2023 y 2024 es ligeramente mayor la notificación de casos de IAP en la SE 39

Intoxicación aguda por plaguicidas (IAP): distribución y proporción de casos notificados por departamentos. Perú 2025* - 2026**

Departamentos	2025*			2026**		
	Casos	%	TIA por 100 000 habitantes	Casos	%	TIA por 100 000 habitantes
Lima	354	21.8	5.4	394	26.0	5.6
Piura	150	9.2	14.8	129	8.5	7.9
Junin	159	9.8	14.6	125	8.3	12.3
Cusco	115	7.1	12.0	110	7.3	12.4
San Martin	93	5.7	22.7	105	6.9	25.2
Huánuco	129	8.0	20.5	94	6.2	18.7
Cajamarca	53	3.3	7.4	78	5.1	11.2
Arequipa	110	6.8	9.8	74	4.9	6.0
La Libertad	93	5.7	9.2	65	4.3	7.6
Ayacucho	70	4.3	18.5	63	4.2	16.9
Lambayeque	11	0.7	19.6	61	4.0	46.8
Amazonas	37	2.3	14.6	39	2.6	17.9
Huancavelica	40	2.5	21.9	35	2.3	24.1
Tacna	28	1.7	12.1	34	2.2	9.5
Apurímac	33	2.0	19.8	31	2.0	15.2
Pasco	29	1.8	18.1	24	1.6	18.0
Ica	72	4.4	19.0	13	0.9	6.8
Puno	11	0.7	5.7	11	0.7	16.9
Ancash	9	0.6	3.1	9	0.6	9.5
Loreto	14	0.9	8.9	8	0.5	7.2
Moquegua	4	0.2	5.0	6	0.4	4.0
Ucayali	5	0.3	2.4	4	0.3	6.0
Callao	1	0.1	0.3	2	0.1	0.5
Madre De Dios	1	0.1	42.3	1	0.1	0.9
Tumbes	1	0.1	13.3	0	0.0	0.0
Total	**1622**	**100.0**	**9.7**	**1515**	**100.0**	**8.9**

(*) Hasta SE- 39 - 2025 y 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

A nivel nacional hasta la SE 39-2026, el 88,3 % de las notificaciones de intoxicación aguda por plaguicidas se concentró en los departamentos de Lima, Piura, Junín, Cusco, San Martín, Huánuco, Cajamarca, Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Lambayeque y Amazonas.

Decremento del 6,6 % comparado en el mismo periodo del año 2025.

Incidencia acumulada de intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) por departamentos, Perú – 2026 (SE 39) *



(*) Hasta SE 39 -2026

uente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

Intoxicación aguda por plaguicidas (IAP), incidencia acumulada según distritos por departamentos, Perú 2026 (SE 39) *



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

A nivel nacional hasta la SE 39 del 2026, se han identificado 392 distritos con notificación de intoxicación aguda por plaguicidas, que corresponden a 111 provincias en 23 departamentos.

Fuente : Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. (*) Hasta la SE – 39 - 2026

CDC MINSA PERU

Distribución proporcional y tasa de incidencia acumulada de Intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) según edad y sexo, Perú 2026 (SE 39*)

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	102	6.7	3.4
Adolescente (12 a 17 años)	225	14.9	13.7
Joven (18 a 29 años)	430	28.4	13.4
Adulto (30 a 59 años)	625	41.3	9.1
Adulto mayor (> de 60 años)	133	8.8	5.7
Total	**1515**	**100.0**	**8.9**
Sexo			
Femenino	536	35.4	6.2
Masculino	979	64.6	11.6

(*) Hasta SE- 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Sal



El 69, 7 % de las IAP se concentran en el grupo de 30 a 59 años (41,3 %) y 18 a 29 años (28,4 %). La mayor tasa de incidencia acumulada se encuentran en jóvenes y adolescentes. El sexo masculino presenta mayor proporción de casos (64,6 %).

Intoxicación aguda por plaguicidas (IAP): distribución proporcional de casos notificados por curso de vida. Perú 2026*

Departamentos	Cursos de vida										Total
	Niño (< de 12 años)		Adolescente (12 a 17 años)		Joven (18 a 29 años)		Adulto (30 a 59 años)		Adulto mayor (> 60 años)		
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	
Lima	23	5.8	35	8.9	115	29.2	186	47.2	35	8.9	394
Piura	11	8.5	26	20.2	22	17.1	58	45.0	12	9.3	129
Junin	16	12.8	35	28.0	37	29.6	28	22.4	9	7.2	125
Cusco	8	7.3	21	19.1	32	29.1	33	30.0	16	14.5	110
San Martin	6	5.7	19	18.1	21	20.0	41	39.0	18	17.1	105
Huánuco	5	5.3	15	16.0	19	20.2	44	46.8	11	11.7	94
Cajamarca	2	2.6	9	11.5	34	43.6	30	38.5	3	3.8	78
Arequipa	6	8.1	11	14.9	26	35.1	28	37.8	3	4.1	74
La Libertad	8	12.3	5	7.7	25	38.5	23	35.4	4	6.2	65
Ayacucho	7	11.1	8	12.7	19	30.2	25	39.7	4	6.3	63
Lambayeque	0	0.0	3	4.9	24	39.3	33	54.1	1	1.6	61
Amazonas	2	5.1	3	7.7	7	17.9	22	56.4	5	12.8	39
Huancavelica	2	5.7	8	22.9	7	20.0	17	48.6	1	2.9	35
Tacna	1	2.9	1	2.9	11	32.4	16	47.1	5	14.7	34
Apurímac	2	6.5	8	25.8	6	19.4	12	38.7	3	9.7	31
Pasco	0	0.0	4	16.7	9	37.5	10	41.7	1	4.2	24
Ica	0	0.0	3	23.1	5	38.5	4	30.8	1	7.7	13
Puno	2	18.2	4	36.4	3	27.3	2	18.2	0	0.0	11
Ancash	0	0.0	3	33.3	2	22.2	3	33.3	1	11.1	9
Loreto	0	0.0	2	25.0	2	25.0	4	50.0	0	0.0	8
Moquegua	0	0.0	1	16.7	2	33.3	3	50.0	0	0.0	6
Ucayali	0	0.0	1	25.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0	4
Callao	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2
Madre De Dios	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
Tumbes	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Total	**102**	**6.7**	**225**	**14.9**	**430**	**28.4**	**625**	**41.3**	**133**	**8.8**	**1515**

(*) Hasta SE- 39 - 2025

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

En la SE 39-2026, el 41,3 % de la notificación de intoxicación aguda por plaguicidas se concentran en adultos, principalmente en Amazonas, Lambayeque, Huancavelica, Lima, Tacna, Huánuco y Huánuco.

En los jóvenes el 28,4 % con mayor proporción en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa, Pasco y Moquegua.

Intoxicación aguda por plaguicidas (IAP): distribución proporcional de casos notificados por tipo de vigilancia epidemiológica. Perú 2026*

GERESA / DIRESA / DIRIS	Tipo de vigilancia				Casos	%
	Activa	%	Pasiva	%		
Lima	1	0.8	307	22.1	308	20.3
Piura	1	0.8	128	9.2	129	8.5
Junin	3	2.4	122	8.8	125	8.3
Cusco	4	3.2	106	7.6	110	7.3
San Martin	2	1.6	103	7.4	105	6.9
Huánuco	25	20.0	69	5.0	94	6.2
Cajamarca	21	16.8	57	4.1	78	5.1
Arequipa	14	11.2	60	4.3	74	4.9
La Libertad	1	0.8	64	4.6	65	4.3
Ayacucho	0	0.0	63	4.5	63	4.2
Lambayeque	0	0.0	61	4.4	61	4.0
Diris Lima Norte	2	1.6	39	2.8	41	2.7
Amazonas	0	0.0	39	2.8	39	2.6
Huancavelica	8	6.4	27	1.9	35	2.3
Tacna	0	0.0	34	2.4	34	2.2
Apurímac	22	17.6	9	0.6	31	2.0
Pasco	0	0.0	24	1.7	24	1.6
Diris Lima Centro	5	4.0	17	1.2	22	1.5
Diris Lima Este	10	8.0	9	0.6	19	1.3
Ica	2	1.6	11	0.8	13	0.9
Puno	1	0.8	10	0.7	11	0.7
Ancash	0	0.0	9	0.6	9	0.6
Loreto	0	0.0	8	0.6	8	0.5
Moquegua	2	1.6	4	0.3	6	0.4
Diris Lima Sur	1	0.8	3	0.2	4	0.3
Ucayali	0	0.0	4	0.3	4	0.3
Callao	0	0.0	2	0.1	2	0.1
Madre De Dios	0	0.0	1	0.1	1	0.1
Total	**125**	**8.3**	**1390**	**91.7**	**1515**	**100.0**

Hasta la SE 39 - 2026, el 91,7 % de los casos notificados de intoxicación aguda por plaguicidas son por vigilancia epidemiológica pasiva y el 8,3% es por vigilancia activa.

(*) Hasta SE: 39 - 2025

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) según edad y sexo, Perú – 2025* y 2026**

2025 *



2026 **



(*) Hasta SE 53-2025 y (*) SE 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – CDC – MINSA – Perú.

Se observa que el grupo de 15 a 19 años en hombres sigue siendo los más expuestos, sin embargo hay un ligero ensanchamiento en el grupo de 20 a 24 años, sugiriendo una persistencia de la exposición en la transición a la adultez. Situación similar se observa en 2025.

Distribución porcentual de casos de intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) según región geográfica Perú 2025* - 2026**





(*) Hasta SE 53-2025 y (*) SE 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – CDC – MINSA – Perú.

A nivel nacional hasta la SE 39 del 2026, según la distribución por región geográfica, el 44,4 % se concentra en la región Costa seguido de la Sierra con 36,2 % del total de casos notificados y es mayor comparado con el año 2025.

Factor de exposición: Intoxicación aguda por plaguicidas según la circunstancia de exposición al plaguicida. Perú 2026 (SE 39) *



(*) Hasta SE 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)- Ministerio de Salud - Perú.

Del total de casos investigados de intoxicación aguda por plaguicidas, se observa predominio de la exposición de tipo voluntaria y ocupacional.

Factor de exposición: Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas según vía de exposición, Perú 2026 (SE 39)*



(*) hasta SE 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud - Perú.

Del total de casos investigados de intoxicación aguda por plaguicidas, la exposición predominante es la vía oral y dermico.

Factor de exposición: Intoxicación aguda por plaguicidas según ocupación. Perú 2026 (SE 39)*



(*) hasta SE 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud - Perú.

Del total de casos investigados, se observa mayor proporción de intoxicación aguda por plaguicidas en las personas con actividad agrícola e independiente.

Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas según tipo de intoxicación. Perú 2026 (SE 39)*



(*) hasta SE 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud - Perú.

Del total de casos investigados de intoxicación aguda por plaguicidas, se observa mayor proporción la intoxicación de tipo leve.

Factor de exposición: Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas según nivel de instrucción, Perú 2026 (SE 39) *



(*) hasta SE 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud - Perú.

Del total de casos investigados de intoxicación aguda por plaguicidas, se observa predominio del nivel de instrucción secundaria, seguido del nivel primaria.

Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas según tipo de seguro, Perú 2026 (SE 39) *



(*) hasta SE 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud - Perú.

Del total de casos investigados de intoxicación aguda por plaguicidas, se observa mayor proporción de asegurados del SIS

Factor de exposición: Distribución proporcional de casos de intoxicación aguda por plaguicidas según lugar de ocurrencia, Perú 2026 (SE 39) *



(*) hasta SE 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud - Perú.

Situación Epidemiológica del riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas a nivel regional hasta la semana epidemiológica (SE) 39 - 2026

CDC MINSA PERU

Fuente : Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. (*) Hasta la SE – 39 - 2026

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Lima, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de Lima 2020-2026 (SE. 39)*



Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según edad por curso de vida y sexo, departamento de Lima, 2026 (SE. 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	23	5.8	2.2
Adolescente (12 a 17 años)	35	8.9	5.9
Joven (18 a 29 años)	115	29.2	8.8
Adulto (30 a 59 años)	186	47.2	6.2
Adulto mayor (> de 60 años)	35	8.9	3.2
Total	**394**	**100**	5.6
Sexo			
Femenino	112	28.4	3.0
Masculino	282	71.6	8.4

(*) Hasta SE- 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos departamento de Lima 2026 (SE. 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

La incidencia acumulada del departamento fue 5,6 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 76,4 %. Predominio del sexo masculino 71,6 %. El 84,5 % de las IAP notificados se concentran en las provincias de Lima (17 distritos), Barranca (5 distritos), Huaral (4 distritos) y Huaura (7 distritos),

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Piura, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de Piura 2020-2026 (SE 39)*



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos Departamento de Piura, 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de Piura, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	11	8.5	3.6
Adolescente (12 a 17 años)	26	20.2	15.8
Joven (18 a 29 años)	22	17.1	7.2
Adulto (30 a 59 años)	58	45.0	9.0
Adulto mayor (> de 60 años)	12	9.3	5.6
Total	**129**	**100.0**	**7.9**
Sexo			
Femenino	49	38.0	6.1
Masculino	80	62.0	9.7

(*) Hasta SE- 39 - 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 7,9 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 62,1 % de los casos. Las provincias de Morropón (8 distritos), Huancabamba (7 distritos), Sullana (6 distritos) y Piura (6 distritos), concentran el 90,7 % de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Junín, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento Junín 2022*-2026 (SE 39**)



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos departamento Junín 2026 (SE 39)*



Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento Junín, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	16	12.8	7.7
Adolescente (12 a 17 años)	35	28.0	31.3
Joven (18 a 29 años)	37	29.6	18.9
Adulto (30 a 59 años)	28	22.4	7.3
Adulto mayor (> de 60 años)	9	7.2	7.4
Total	**125**	**100**	12.3
Sexo			
Femenino	49	39.2	9.6
Masculino	76	60.8	14.9

(*) Hasta SE- 39 - 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 12,3 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida jóvenes y adultos concentran el 52,0 % de los casos. El 87,2 % de las IAP notificados se concentra en las provincias de Huancayo (11 distritos), Tarma (6 distritos), Chanchamayo (3 distritos), Satipo (4 distritos) y Jauja (8 distritos).

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Cusco, Perú 2026 (SE 39)*



Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de Cusco, 2026 (SE 39*)

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	8	7.3	4.7
Adolescente (12 a 17 años)	21	19.1	22.2
Joven (18 a 29 años)	32	29.1	18.6
Adulto (30 a 59 años)	33	30.0	9.4
Adulto mayor (> de 60 años)	16	14.5	16.1
Total	**110**	**100**	**12.4**
Sexo			
Femenino	43	39.1	9.9
Masculino	67	60.9	14.8

(*) Hasta SE- 39 - 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos departamento de Cusco 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

La incidencia acumulada del departamento fue 12,4 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 59,1 % de los casos. Predominio del sexo masculino 60,9 %. Las provincias de Cusco (5 distritos), La Convención (8 distritos), Canchis (4 distritos) y Chumbivilcas (3 distritos), concentran el 80,0 % de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de San Martín, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de San Martín 2020-2026 (SE 39)*



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos Departamento de San Martín, 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de San Martín, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	6	5.7	6.6
Adolescente (12 a 17 años)	19	18.1	38.1
Joven (18 a 29 años)	21	20.0	25.3
Adulto (30 a 59 años)	41	39.0	27.6
Adulto mayor (> de 60 años)	18	17.1	41.1
Total	**105**	**100**	**25.2**
Sexo			
Femenino	29	27.6	14.6
Masculino	76	72.4	34.9

(*) Hasta SE- 39 - 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 25,2 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 59,0 % de los casos. Las provincias de Moyobamba (5 distritos), Bellavista (4 distritos), Rioja (8 distritos) y Tocache (3 distritos), concentran el 93,3 % de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Huánuco, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de Huánuco, 2020 - 2026 (SE 39)*



Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de Huánuco, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	5	5.3	4.5
Adolescente (12 a 17 años)	15	16.0	25.0
Joven (18 a 29 años)	19	20.2	18.6
Adulto (30 a 59 años)	44	46.8	24.2
Adulto mayor (> de 60 años)	11	11.7	23.2
Total	**94**	**100.0**	**18.7**
Sexo			
Femenino	29	30.9	11.7
Masculino	65	69.1	25.6

(*) Hasta SE- 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos Departamento de Huánuco, 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

La incidencia acumulada del departamento fue 18,7 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 67,0 % de los casos. Predominio del sexo masculino (69,1 %). Las provincias de Huánuco (9 distritos), Leoncio Prado (7 distritos), Yarowilca (2 distritos), Huamalíes (4 distritos), Puerto Inca (2 distritos) y Marañón (3 distritos), concentran el 80,9 % de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Cajamarca, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de Cajamarca, 2020-2026 (SE 39)*



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos Departamento de Cajamarca, 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de Cajamarca, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	2	2.6	1.3
Adolescente (12 a 17 años)	9	11.5	10.9
Joven (18 a 29 años)	34	43.6	24.9
Adulto (30 a 59 años)	30	38.5	11.6
Adulto mayor (> de 60 años)	3	3.8	4.6
Total	**78**	**100**	**11.2**
Sexo			
Femenino	28	35.9	8.1
Masculino	50	64.1	14.4

(*) Hasta SE- 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 11,2 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jovenes y adultos concentran el 82,1 % de los casos. Predominio del sexo masculino (64,1 %). La provincias de Cajamarca (6 distritos), Jaén (7 distritos), San Miguel (2 distritos), Celendín (2 distritos) y San Ignacio (5 distritos), concentran el 92,3 % de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Arequipa, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de Arequipa 2020 - 2026 (SE 39)*



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos departamento de Arequipa 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de Arequipa, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	6	8.1	3.1
Adolescente (12 a 17 años)	11	14.9	10.0
Joven (18 a 29 años)	26	35.1	11.2
Adulto (30 a 59 años)	28	37.8	5.5
Adulto mayor (> de 60 años)	3	4.1	1.6
Total	**74**	**100**	**6.0**
Sexo			
Femenino	40	54.1	6.5
Masculino	34	45.9	5.6

(*) Hasta SE- 39 - 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 6,0 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida jóvenes y adultos concentran el 72,9 %. Las provincias de Arequipa (13 distritos) y Caylloma (1 distrito) concentra el 97,3 % de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de La Libertad, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento La Libertad 2022*-2026 (SE 39**)



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos departamento La Libertad 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento La Libertad, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	8	12.3	5.3
Adolescente (12 a 17 años)	5	7.7	6.4
Joven (18 a 29 años)	25	38.5	17.0
Adulto (30 a 59 años)	23	35.4	6.6
Adulto mayor (> de 60 años)	4	6.2	2.9
Total	**65**	**100**	**7.6**
Sexo			
Femenino	13	20.0	3.0
Masculino	52	80.0	12.1

(*) Hasta SE- 39 - 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 7,6 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida jóvenes y adultos concentran el 73,9 % de los casos. Predominio del sexo masculino (80,0 %). El 93,8 % de las IAP notificados se concentran en las provincias de Sánchez Carrión (6 distritos), Pacasmayo (3 distritos) y Trujillo (2 distritos).

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento Ayacucho, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento Ayacucho 2020 - 2026 (SE 39)*



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos departamento de Ayacucho 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento Ayacucho, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	7	11.1	8.7
Adolescente (12 a 17 años)	8	12.7	18.6
Joven (18 a 29 años)	19	30.2	25.2
Adulto (30 a 59 años)	25	39.7	17.7
Adulto mayor (> de 60 años)	4	6.3	12.3
Total	**63**	**100**	**16.9**
Sexo			
Femenino	27	42.9	14.9
Masculino	36	57.1	18.8

(*) Hasta SE- 39 - 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 16,9 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 69,9 %. Predominio del sexo masculino (57,1 %). Las provincias de Huanta (8 distritos), La Mar (4 distritos) y Huamanga (9 distritos), concentran el 98,4 % de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Lambayeque, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento Lambayeque 2022*-2026 (SE 39**)



Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento Lambayeque, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	0	0.0	0.0
Adolescente (12 a 17 años)	3	4.9	24.0
Joven (18 a 29 años)	24	39.3	111.2
Adulto (30 a 59 años)	33	54.1	66.1
Adulto mayor (> de 60 años)	1	1.6	4.0
Total	**61**	**100.0**	**46.8**
Sexo			
Femenino	29	47.5	43.0
Masculino	32	52.5	50.8

(*) Hasta SE- 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos departamento Lambayeque 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

La incidencia acumulada del departamento fue 46,8 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida jóvenes y adultos concentran el 93,4 % de los casos. El 98,4 % de las IAP notificados se concentra en la provincia de Chiclayo (6 distritos).

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Amazonas, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de Amazonas 2019* - 2026 (SE 39)**



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos Departamento de Amazonas, 2026 (SE 39*)



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de Amazonas, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	2	5.1	3.4
Adolescente (12 a 17 años)	3	7.7	11.3
Joven (18 a 29 años)	7	17.9	17.2
Adulto (30 a 59 años)	22	56.4	30.0
Adulto mayor (> de 60 años)	5	12.8	26.9
Total	**39**	**100**	**17.9**
Sexo			
Femenino	7	17.9	6.6
Masculino	32	82.1	28.7

(*) Hasta SE- 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 17,9 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 74,3 % de los casos .Las provincias de Bagua (6 distritos), Utcubamba (3 distritos) y Chachapoyas (2 distritos) concentran el 89,7 % de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Huancavelica, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de Huancavelica 2020-2026 (SE 39)*



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos Departamento de Huancavelica, 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de Huancavelica, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	2	5.7	5.6
Adolescente (12 a 17 años)	8	22.9	41.5
Joven (18 a 29 años)	7	20.0	22.9
Adulto (30 a 59 años)	17	48.6	35.5
Adulto mayor (> de 60 años)	1	2.9	8.4
Total	**35**	**100**	**24.1**
Sexo			
Femenino	20	57.1	27.8
Masculino	15	42.9	20.4

(*) Hasta SE- 39 - 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 24,1 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 68,6 % de los casos. Las provincias de Tayacaja (6 distritos), Huancavelica (7 distritos) y Acobamba (2 distritos), concentran el 85,7 % de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Tacna, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de Tacna 2020-2026 (SE 39)*



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos Departamento de Tacna, 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de Tacna 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	1	2.9	2.0
Adolescente (12 a 17 años)	1	2.9	3.4
Joven (18 a 29 años)	11	32.4	17.1
Adulto (30 a 59 años)	16	47.1	10.1
Adulto mayor (> de 60 años)	5	14.7	8.9
Total	**34**	**100**	**9.5**
Sexo			
Femenino	7	20.6	4.0
Masculino	27	79.4	14.7

(*) Hasta SE- 39 - 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 6,8 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 68,3 % de los casos. Las provincias de Pisco (4 distritos) e Ica (1 distrito), concentran el 100% de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Apurímac, Perú 2025 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de Apurímac 2020-2026 (SE 39)*



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos Departamento de Apurímac, 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de Apurímac, 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	2	6.5	4.5
Adolescente (12 a 17 años)	8	25.8	34.1
Joven (18 a 29 años)	6	19.4	16.2
Adulto (30 a 59 años)	12	38.7	15.0
Adulto mayor (> de 60 años)	3	9.7	16.1
Total	**31**	**100**	**15.2**
Sexo			
Femenino	20	64.5	20.3
Masculino	11	35.5	10.5

(*) Hasta SE- 39 - 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 15,2 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 58,1 % de los casos. Predominio del sexo femenino (64,5 %). Las provincias de Abancay (6 distritos) y Cotabambas (3 distrito), concentra el 90,3 % de los casos.

Indicadores epidemiológicos: Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), departamento de Pasco, Perú 2026 (SE 39)*

Tendencia: casos de Intoxicación aguda por plaguicidas por semanas epidemiológica. Departamento de Pasco 2020-2026 (SE 39)*



Incidencia acumulada (IA) de IAP por distritos Departamento de Pasco, 2026 (SE 39)*



(*) Hasta la SE 39 – 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú

Proporción de Intoxicación Aguda por Plaguicidas según sexo y edad por curso de vida, departamento de Pasco 2026 (SE 39)*

Edad (según curso de vida)	Casos	%	TIA por 100,000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	0	0.0	0.0
Adolescente (12 a 17 años)	4	16.7	25.5
Joven (18 a 29 años)	9	37.5	36.0
Adulto (30 a 59 años)	10	41.7	19.7
Adulto mayor (> de 60 años)	1	4.2	7.2
Total	**24**	100.0	18.0
Sexo			
Femenino	8	33.3	12.4
Masculino	16	66.7	23.2

(*) Hasta SE- 39 - 2026
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

La incidencia acumulada del departamento fue 6,8 por cada 100 mil personas. Según edad por curso de vida los jóvenes y adultos concentran el 68,3 % de los casos. Las provincias de Pisco (4 distritos) e Ica (1 distrito), concentran el 100% de los casos.

Distribución proporcional y tasa de letalidad de defunciones por Intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) según edad y sexo, Perú 2026*

Edad (según curso de vida)	Casos	Defunciones	%	Tasa de letalidad por 100 casos
Niño (0 a 11 años)	102	1	3.6	1.0
Adolescente (12 a 17 años)	225	5	17.9	2.2
Joven (18 a 29 años)	430	8	28.6	1.9
Adulto (30 a 59 años)	625	11	39.3	1.8
Adulto mayor (> de 60 años)	133	3	10.7	2.3
Total	**1515**	**28**	**100.0**	**1.8**
Sexo				
Femenino	536	11	39.3	2.1
Masculino	979	17	60.7	1.7

(*) Hasta SE- 39 - 2025 y 2026

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) - Ministerio de Salud – Perú.

El 67,9 % de las defunciones por IAP se concentran en los adultos (30 a 59 años) y jóvenes (18 a 29 años). La tasa de letalidad a nivel nacional es 1,8 por cada 100 casos de IAP. La mayor tasa de letalidad se observan en adolescentes y adultos mayores.

GRACIAS

Equipo Técnico
Unidad Técnica de Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Ambientales para la Salud (UTVERAS)

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) - Ministerio de Salud
Calle Daniel Olaechea Nº 191• Lima 11 • Jesús María

Teléfono: (511) 631-4500, Anexo 5647

CDC MINSA PERU