

DEFINICIÓN DE CASO DE ANAFILAXIA

La anafilaxia es un síndrome clínico que se caracteriza por:

- * aparición repentina y
- * progresión rápida de los signos y síntomas y
- * compromiso de múltiples sistemas orgánicos (>2), a medida que progresa.

Se consideran 3 niveles de certeza diagnóstica:

Nivel 1 de certeza diagnóstica

- > 0 = 1 criterio dermatológico mayor Y
- > 0 = 1 criterio cardiovascular mayor Y/O > 0 = 1 criterio respiratorio mayor

Nivel 2 de certeza diagnóstica

- > 0 = 1 criterio cardiovascular mayor Y > 0 = 1 criterio respiratorio mayor O
- > 0 = 1 criterio cardiovascular O respiratorio mayor Y
- > 0 = 1 criterio menor que compromete > 1 sistema diferente (que no sea el sistema cardiovascular o respiratorios) O
- (> 0 = 1 criterio dermatológico mayor) Y (> 0 = 1 criterio cardiovascular menor Y/O criterio respiratorio menor).

Nivel 3 de certeza diagnóstica

- > 0 = 1 criterio cardiovascular O respiratorio menor Y
- > 0 = 1 criterio menor de > 0 = 2 sistemas / categorías diferentes

✓ CRITERIOS MAYORES USADOS EN LA DEFINICIÓN DE CASO DE ANAFILAXIA:

Dermatológicos o mucosos

- Urticaria o eritema generalizados
- Angioedema, localizado o generalizado
- Prurito generalizado con erupción cutánea

Cardiovasculares

- hipotensión medida
- diagnóstico clínico de choque descompensado, indicado por la combinación de al menos 3 de los siguiente
 - ✚ taquicardia
 - ✚ tiempo de llenado capilar > 3 s
 - ✚ volumen de pulso central reducido
 - ✚ nivel reducido de conciencia o falta de conciencia

Respiratorios

- sibilancia bilateral (broncoespasmo)
- estridor
- hinchazón de las vías respiratoria superiores (labio, lengua, garganta, úvula o laringe)
- insuficiencia respiratoria – 2 o más de los siguientes
 - ✚ taquipnea
 - ✚ mayor uso de los músculos respiratorios accesorios
 - ✚ recesión
 - ✚ cianosis
 - ✚ quejido

✓ **CRITERIOS MENORES USADOS EN LA DEFINICIÓN DE CASO DE ANAFILAXIA:**

Dermatológicos o mucosos

- Prurito generalizado sin erupción cutánea
- Sensación generalizada de picor
- Urticaria localizada en el sitio de la inyección
- Ojos rojos e irritados (que pican)

Cardiovasculares

- Circulación periférica reducida como lo indica la combinación de al menos de estos 2
 - ✚ taquicardia
 - ✚ tiempo de llenado capilar > 3 s sin hipotensión
 - ✚ nivel reducido de conciencia

Respiratorios

- tos seca persistente
- voz ronca
- dificultad para respirar sin sibilancia o estridor
- sensación de que se cierra la garganta
- estornudo, rinorrea

Gastrointestinales

- diarrea
- dolor abdominal
- náuseas
- vómitos

Laboratorio

- Elevación de la triptasa en mastocitos > límite normal superior