

FIEBRE AMARILLA


¿Qué es la fiebre amarilla?

Es una enfermedad viral infecciosa aguda que puede presentarse con síntomas leves o provocar la muerte. Es causada por un virus que se transmite por la picadura de mosquitos infectados, pero es prevenible por vacunación.

¿Cuáles son los signos y síntomas?

Las personas que contraen el virus pueden iniciar síntomas de 3 a 6 días después de la picadura del mosquito infectado. Estos incluyen:

- **Fiebre alta (mayor a 39°C)**
- **Dolor muscular**
- **Dolor de cabeza**
- **Pérdida de apetito**
- **Náuseas o vómitos**
- **Coloración amarilla en la piel y ojos**
- **Dolor abdominal**
- **Vómito con sangre**
- **Hemorragias: nariz, encías, orina, heces, entre otros**





Si la enfermedad progresara a una fase severa, puede afectar órganos como el hígado y los riñones, produciendo una característica coloración amarilla de la piel y ojos (ictericia). En esta fase, se requiere la hospitalización y manejo clínico especializado.

¿Quiénes están en riesgo?

Todas las personas que no han recibido la vacuna contra la fiebre amarilla y que ingresan a zonas endémicas y/o transmisión activa de la enfermedad en la selva rural.

Distribución de la Fiebre Amarilla en el Mundo

La enfermedad está presente en regiones tropicales de África, América Central y América del Sur. Durante la última década, en la región de las Américas países y territorios como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela, están considerados en riesgo, por haber registrado brotes y muertes¹.



Antes de viajar al Perú

Los viajeros deben considerar la vacunación contra fiebre amarilla, como medida de prevención si su itinerario incluye visita a zonas de selva rural.

Los viajeros que visitan zonas de selva rural y que no han recibido la vacuna, podrían estar en riesgo de enfermar, especialmente si visitan una zona con transmisión activa de fiebre amarilla, por lo cual se recomienda:

¹ Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud. Fiebre amarilla. [Internet]. Washington: Organización Mundial de la Salud; [Citado 14 de octubre de 2025]. Recuperado a partir de: <https://www.paho.org/es/temas/fiebre-amarilla>

1. Verificar su estado vacunal:

- Si tiene planificado visitar zonas rurales de la Amazonía (selva) en Perú, se recomienda recibir la vacuna al menos 10 días antes de su viaje, para garantizar la protección.
- La vacunación en el Perú, está recomendada a partir de los 15 meses hasta los 59 años de edad²; una sola dosis proporciona protección de por vida contra la enfermedad, es importante observar las situaciones en que no se recomienda la vacunación³ y las consideraciones de la vacunación en otros países para los viajeros internacionales.
- El Ministerio de Salud del Perú ofrece la vacuna en centros de vacunación públicos:
<https://www.gob.pe/25427-conocer-centros-de-vacunacion-contra-la-fiebre-amarilla-en-el-peru>.

2. Certificado de vacunación:

- Para ingresar al Perú, las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación previa y es posible que, en algunas áreas de ingreso a selva rural con zonas endémicas, se solicite el certificado de vacunación.


3. Informarse sobre la situación epidemiológica:

- Las zonas endémicas en el país incluyen áreas de selva rural alta o baja, en las siguientes regiones:

Amazonas, Cusco (no se consideran la ciudad de Cusco, Machu Picchu y el Camino Inca), Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.



- Para mayor información sobre la distribución de los casos y actividad de esta enfermedad en el Perú, consultar el siguiente enlace:
<https://www.dge.gob.pe/sala-fiebre-amarilla/tablero.html>.



Durante su estadía en Perú

Todos los viajeros que visitan alguna zona rural de las regiones de selva, especialmente los que tienen condiciones especiales para recibir la vacuna², deben adoptar las siguientes medidas de protección individual:


Uso de repelente con DEET (15%-25%)



Uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo



Uso de mosquiteros



Posterior a su viaje

Los viajeros deberán monitorizar su estado de salud, por al menos siete días, y estar atentos ante la presencia de los siguientes signos y síntomas: Fiebre, dolor muscular, dolor de espalda intenso, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida de apetito y náuseas o vómitos.

De presentar alguno de los signos y síntomas antes mencionados, consultar inmediatamente con un profesional médico o buscar atención de salud, informando al médico tratante el antecedente y zonas de desplazamiento durante el viaje.

² Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación. [Internet]. Perú; [Citado 14 de octubre de 2025]. Recuperado a partir de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3823311/Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20Salud.pdf?v=1668009871>

³ La vacunación contra la Fiebre amarilla, está contraindicada en: menores de 6 meses de edad, alergia al componente de la vacuna, infección por VIH (sintomática), inmunodeficiencias primarias, tratamiento inmunosupresor, neoplasias, trastorno del timo, trasplante, mayor de 59 años de edad, embarazo y lactancia.